Bilaga 1

Sammanställning av biverkningar beskrivna i licensansökningar 2014 av psykiatriker verksamma i Stockholms län

Aban Alkhaib
Tio Hundra Norrtälje

Concerta, Ritalin

- Concerta 18 mg som höjdes upp till 126 rng utan önskade effekt …2010 kombination Conserta 126 mg och Ritalin 20 mg …nedstämdhet, svårighet att fokusera. koncentrera sig, nedsatt stresstolerans, fastnar och får inte saker och ting gjorda … svårt att hålla ordning hemma, allt känns som kaos, trötthet och sömnlöshet.

Alicja Chowra Skoglund
Tio Hundra Norrtälje

Ritalin, Concerta, Elvanse

- Ritalinmedicinering … har reagerat på detta med hjärtklappning
  Concerta har reagerat på det med rethosta, andningsbesvär
  Elvanse … biverkningar i form av muskelvärk

Anna Mademyr
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Flera centralstimulantia

- … flertal centralstimulantia men pat haft biverkningar samt på vissa preparat stegrad ångest

Bahram Aflaki
SLSO

Concerta, Ritalin

- ingen effekt av Concerta och Ritalin samtidigt besvärliga biverkningar

Bengt Almström
SLSO

1. Metylfenidat

- behandlats med metylfenidat dock med otillräcklig effekt och oacceptabla biverkningar i form av xerostomi samt depression.

2. Concerta, Elvanse

- Concerta, biverkningar i form av hjärtklappning , illamående ökad spänning i käkleden,

aptitlöshet, byte till Elvanse, hyfsad effekt dock biverkningar i form av torr i munnen spec gomtaket, upplevs som mkt obehagligt , grava sömnsvårigheter, uttalad aptitlöshet, magtarmproblem, tackycardi

3. Metylfenidat, Strattera

- metylfenidat och även med Strattera , det har ej gått att komma upp i adekvata doser pga biverkningar fr a i form av gastrointestinala sådana, samt Huvudvärk , yrsel, trötthet.

Bengt Kjellman
SLSO

1. Ritalin, Concerta

- Ritalin i hög dosering med otillräcklig effekt … Concerta med otillräcklig effekt

2. Ritalin, Elvanse

- … rltalina och elvanse i adekvat dosering med otillräcklig effekt.

3. Ritalin, Elvanse

- Ritalina i adekvat dosering med otlllräckllg effekt
  Elvanse … oacceptabel biverkan i form av tremor

Bengt Malmgren
SLSO

Ritalin, Elvanse

- Ritalin har även i små doser gett alllför stora biverkningar (hjärtklappning, magbesvär, ångest, svettningar. muntorrhet)
  Elvanse … mkt sympaticusbiverkningar

Birgitta Eriksson
SLSO

1. Metylfenidat, Strattera, Elvanse

- Metylfenidat … febrig känsla …
  Strattera medförde aggressivitet, blev lättirritabel och psykiskt labil …
  Elvanse … nedsatt aptit … oerhört trött…

2. Concerta, Medikinet, Elvanse

- Concerta gav ökad ångest mot slutet av dagen ..
  Medikinet gav biverknlngar i form av muntorrhet, ökade svettnlngar, lätt känsla av att bli uppvarvad.
  Elvanse … sömnsvårigheter, nedsatt aptit, svettningar, spänningar i käke

3. Ritalin, Elvanse

- Ritalin, Elvanse …ger nästan ingen effekt endast trötthet när de går ur.

4. Lång- och kortverkande centralstimulantia

- lång och kortverkande Centralstimulantia men fått biverkningar i form av depressivitet och panikångest

Boel Gustafson
SLSO

Metylfenidat, Strattera, Elvanse

- otillräckllg effekt av metylfenidat
  och oacceptabla biverkningar av atomoxetin
  Oacceptabla biverkningar av Elvanse 60 mg

Carin Arkhammar
SLSO

1. Concerta, Ritalin, K Ritalin

- Concerta … Ritalin … biv i form av ångest o hjärtklappning …
  K Ritalin … Efterhand kraftiga biverkningar i form av tilltagande ångest, yrsel, BT-fall, huvudvärk, sömnsvårigheter…

2. Ritalin, Strattera

- Ritalin … piggare men sedan alltmer uppstressad. splittrad, glömsk o utmattad.
  Biv av Strattera i form av kliande huduslag

3. Concerta, Strattera, Ritalin, Elvanse

- Sen 3,5 åren prövat Concerta upp till 72mg, utan effekt,
  Strattera upp till 80mg i 2 omg … med tveksam effekt, biv i forrn av hjärtklappning.
  Därefter t Ritalin … utan effekt. BT-förhöjning under medicineringen
  Elvanse … svettningar ffa nattetid, sömnstörning

Einar Kristjansson
Capio Maria

1. Strattera, Medikinet, Concerta, Elvanse

- Strattera, Medikinet , Concerta och Elvanse utan framgång. Fått biverkningar eller otlllräcklig effekt.
  Beh f.n. med Medikinet, besväres av otillräcklig effekt
  Fick illamående och ojämn effekt av Concerta.
  Ritalin gav pat social fobi förutom svårt illamående

2. Strattera, Medikinet, Elvanse

- Gått på Strattera, Medikinet och Elvanse merl fått biverkningar.
  Av Elvanse kände pat sig håglös, låg hela tiden i sängen trots 140mg/dygn. Blev enl beskrivning deprimerad …

Elena Litouchenko
PRIMA Åkersberga

Alla CS, Elvanse, Strattera

- provat alla CS, även Elvanse samt Strattera med hög biverkningsprofil som följd.

Eleonore Ryden
SLSO
(Rapporterat sex fall av biverkningar för Metylfenidat Sandoz till Läkemedelsverket under 2014, ingen annan biverkningsrapport)

1. Metylfenidat, Elvanse

- Metylfenidat… biverkningar i form av ökad aggressivitet.
  Elvanse har givit sömnsvårigheter…

2. Metylfenidat

- metylfenidat … mycket påtagligt illamående med vlktminskning och ledvärk

3. Metylfenidat i olika beredningsformer, Elvanse

- metylfenidat i olika beredningsformer med oacceptabla biverkningar i form av huvudvärk och magsmärta. Elvanse har också givit magsmärta och påtagliga sömnsvårigheter

Erik Skoog
PRIMA Åkersberga

Concerta, Ritalin

- Concerta har inte givit effekt alls.
  Ritalin … 120 mg knappt effekt och stora biverkningar…

Eva Lyssarides
EL Psykiatri AB

1. Strattera, Concera, Ritalin, Elvanse

- Strattera, Concerta, Ritalin, Elvanse …tappar helt aptiten med viktnedgång som följd

2. Concerta, Ritalin, Elvanse

- Concerta, Ritalin och senast Elvanse med biverkningar såsom aptitnedsättning illamående, trötthet då medicinen gått ur kroppen

Eva Malm
SLSO

1. Metylfenidatpreparat, Strattera

- … testat en rad olika metylfenidatpreparat samt strattera med biverkningar i form av hjärtklappning, ökad ångest, svettningar…

2. Strattera, Concerta

- Strattera med viss effekt, men biv i form av takykardi. Concerta upp tlll 72 mg, Ritalin upp till 60 mg gav oacceptabla biv i form av förvärrade humörsvängningar.

3. Ritalin, Concerta, Elvanse

- … oacceptabla biverkningar av Ritalin och Concerta, provat Elvanse men fått anafylaktisk reaktion som ska biverkningsanmälas. (Vilket inte kan ses ha skett från de rapporter som inkommit till biverkningsregistret för 2014.)

4. Metylfenidat, Elvanse

- … otlllräcklig effekt av Metylfenidat i hög dos,
  provat Elvanse men trots dosökning utebliven effekt och biverkan i form av extrem trötthet…

5. Medikinet, Elvanse

- Medikinet med otillräcklig effekt samt oacceptabla biverkningar i form av ökad oro, nervositet
  samt även ökad svettning, ökad muntorrhet, lättare darrning och skakningar i händerna …
  Elvanse … när effekten försvlnner upplever patienten att del fungerar sämre än utan elvanse.

6. Ritalin, Equasym, Elvanse

- … provat Ritalin och Equasym med oacceptabla biverkningar i form av kraftiga svettningar, provat Elvanse men har haft mycket obehagliga humörsvängnlngar når medicinen varit i kroppen, varit aggressiv, irrittabel, gråtmild och euforisk omvartannat och har därför avbrutit behandlingen.

7. Concerta, Ritalin, Medikinet, Elvanse

- … haft oacceptabla biverkningar av Concerta, Ritalin och Medikinet (svettningar, aptltföriust, håravfall mm)…
  … upplever effekten av Elvanse som mycket obehaglig

Eva Paullkovics
SLSO

1. metylfenidat, Strattera, Elvanse

- prövat mediciner som är godkända i Sverige…obehagliga biverkningar som varaktiga sömnsvårigheter. brist på kreativitet, alopeci.
  Elvanse … huvudvärk…

2. Godkända centralstimulerande mediciner, Elvanse

- godkända centralstimulerande mediciner … seponera dem på grund av biverkningar…
  Elvanse … stark ångest…

Gabriella Telegdy
SLSO

Strattera, Elvanse, Concerta

- Strattera som inte gav någon effekt.
  Elvanse … oacceptabla biverkningar
  Concerta otillräcklig effekt

Gunilla Lund
SLSO

Concerta, Ritalin, Strattera, Elvanse

- Concerta, Ritalin, Strattera och Elvanse … aptitlöshet/viktnedgång och håravfall…

Gunilla Olsson
PRIMA Haninge/Privat

1. Strattera, metylfenidat, Elvanse [”Vivanse”]

- Strattera men det gav ingen effekt
  metylfenidat … illamående, blev låg i humöret och kunde inte fortsätta
  Vivanse (sic!) gav en märklig biverkan med harklingar och svårighet att tala

2. Metylfenidat, Strattera, Elvanse

- Svåra biverkningar av metylfenidat, atomoxetin och nu senast Elvanse…
  På de här känsliga barnen kan det ibland fungera med Metamina.

Gunnar Jakobsson
CEREB AB
(En rapport inskickad till Läkemedelsverkets biverkningsregister under 2014 – för Elvanse 30 mg)

1. Concerta, Ritalin, Elvanse

- Concerta, Ritalin och nu senast **Elvanse** … har endast marginell effekt av metylfenidat och får oacceptabla biverkningar, svårt att sova, blir också orolig och deppig.

2. Metylfenidat, Elvanse

- två olika metylfenidatpreparat men fick stora problem med oro, hjärtklappning, ångest i sociala situationer … Elvanse … hypervigilant och fastnade…

Gustav Sylvesten
Tio Hundra Norrtälje

Metylfenidater, Elvanse, Strattera

- Bieffekt samtliga fenylfenidater (sic!) och Elvanse. svullen tunga Strattera. Nedstämd.

Harriet Häggblom
SLSO

Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera, Elvanse

- prövat medicinering med Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet och Strattera med otillräcklig effekt och svåra biverknlngar … Elvanse … biverkan med svår sömnlöshet.

Hiie Allik
SLSO

1. Strattera, tre centralstimulantia

- Strattera samt tre olika centralstimulantia, men utan önskad effekt och med biverkningar: oro, hjärtklappning, svettningar.

2. Ritalin, Concerta, Medikinet, Strattera, Voxra

- … centralstimulerande preparat, men utan önskad effekt och med biverkningar (magbesvär och svettningar av Ritalin och Concerta, hjärtklappningsbesvär av Medikinel). Har också

prövat Strattera och Voxra, men även dessa läkemedel utsatta pga utebliven effekt och ohållbara biverkningar.

Inger Hidmark
Tio Hundra Norrtälje

Concerta, Strattera, Medikinet

- Concerta togs tillsammans med Strattera men hade kvarstående biverkningar men Ingen effekt … biverkningar som dock ökat sista året i form av dimsvn, muskel och ledvärk, tappat håret … Medikinet … insomningssvårigheter, vaknar tidigt på morgonen och har huvudvärk samt blivit mer orolig och ängslig samt hjärtklappning.

Irene Ståhl
Capio Nacka

Medikinet, Ritalin, Elvanse

- Medikinet och Ritalin men fått biverkningar även av Elvanse

Jan Isenberg
PRIMA Åkersberga

Concerta, Elvanse

- Concerta … besvärande biverkningar i form av energifattighet och ångest
  Elvanse som ej gav ångest ….men som har ett alltför långsamt tillslag

Jeanette Gregorova
SLSO, Beroendecentrum

Concerta, Strattera, Elvanse

- Concerta. med utebliven effekt efter doshöjningar men fått biverkningar.
  Strattera utan effekt.
  Elvanse … effekten på ADHD-relaterade symtom uteblir

Karin Bondesson
SLSO

Ritalin, Strattera, Modiodal, Elvanse

- Ritalin, Strattera, Modiodal, Elvanse med otillräcklig effekt och oacceptabla biverkningar… förvärrad sömnstörning av alla cs-preparat

Kathy Kamangar
PRIMA Lidingö

1. Metylfenidat, Elvanse

- Metylfenidat som lett till ökad aggressivitet, GI-besvär och muskelvärk
  Elvanse … tungt i kroppen …signifikanta sexuella biverkningar …

2. ”Godkända läkemedel”, Elvanse

- prövat godkända läkemedel med otillräcklig effekt …
  Elvanse … huvudvärk och dimsyn som biverkning

Kenneth Uhre
Ersta Diakoni

Concerta, Ritalin, Elvanse

- Concerta, Ritalin och Elvanse, men fått biverkningar av dessa.
  Concerta trötthet och förhöjd ångest, av Ritalin spändhet och obehaglig känsla när medicinen går ur kroppen och av Elvanse ökad ångest…

Lars Tigerström
SLSO

1. metylfenidat i olika beredningar, Elvanse

- Oacceptabla biverkningar av metylfenidat i olika beredningar såsom sömnstörning, ångest och hjärtklappning. Prövat lisdexamfetamin (Elvanse) men fick sluta då långverkande beredning gav påtaglig huvudvärk, torr hud, muskel ooh ledvärk, muntorrhet, dålig andedräkt, hjärtklappning: yrsel, sexuella biverkninar: bådo minskad lust ooh funktion. Likgiltighet, sömnstörningar.

2. Medikinet, Concerta, Equasym, lisdexamfetamin (Elvanse)

- … metylfenidat i form av Medikinet. Concerta samt Equasym men ej tolererat medicinen på grund av kända biverknlngar ffa nedstämdhet. illamående samt svettningar…
  lisdexamfetamin … svettningar, illamående samt känt sig spänd i kroppen … Ej heller varit komfortabel med den långverkande effekten …

3. metylfenidat i olika beredningar, lisdexamfetamin (Elvanse)

- Oacceptabla biverkningar av metylfenidat i olika beredningar såsom sömnstörning, ångest och hjärtklappning.
  Prövat lisdexamfetamin (Elvanse) men fick sluta då långverkande beredning gav påtagliga sömnstörningar

4. metylfenidat, Elvanse

- … metylfenidat … ej tolererat detta pga av biverkan i form av ledvärk …
  Elvanse …inre oro och ångest…

Marie Bokström
SLSO

Ritalin, Concerta, Strattera, Elvanse

- Ritalin fick … obehagskänsla i kroppen, blev spänd i käkarna, upplevde tilltagande ångest och darrighet i händerna…
  Concerta … motoriska tics
  Strattera … obehagliga och negativa tankar
  Elvanse … reagerade dessvärre med påträngande negativa, obehagliga tankar dag två och tre av medicineringen.

Marina Petkovic
Capio Nacka

1. metylfenidat, Strattera, Elvanse

- … metylfenidat, Atomoxetin samt Elvanse. Har fått ohållbara bieffekter

2. flera preparat med olika profil, Elvanse

- flera preparat med olika profil inklusive Elvanse, avbrutit behandling pga kombination av bieffekter och brlstfälllg effekt. Elvanse gav ihållande bieffekter…

Marita Leijel Arnell
AKMAneuro Täby

metylfenidat, Strattera, Elvanse

- metylfenidat, men har fått oaccetabla biverkningar även vid låga doser…oacceptabel känsla av avtrubbning, upplever sig som att finna sig i en "glaskupa".
  Har även provat Strattera men detta gav irritabilitet och sömnstörningar.
  Elvanse … oacceptabla biverkningar i form av pulsstegring, palpitationer .. en påtaglig inre oro

Martína Barnevik Olsson
PRIMA Spånga

metylfenidat

- metylfenidat upp till 2 mg/kg … fått biverkningar i form av yrsel, illamående och huvudvärk

Mats Örneborg
SLSO

1. Metylfenidat

- Metylfenidat … med biverkningar som antyder eventuell ackumulering av blod koncentration samt starkt obehag när metylfenidat går ur… Även kortverkande metylfenidat gett obehagliga utsättningsbiverkningar när substansen går ur.

2. Strattera, samtliga beredningar av metylfenidat, lisdexamfetamin

- Atomoxetin gav inte effekt och samtliga beredningar av metylfenidat samt även försök med lisdexamfetamin gett kraftiga utsättningseffekter på eftermiddag/kväll Pt har då fått svår ångest/oro som håller i sig flera timmar.

3. Metylfenidat

- Metylfenidat gett kraftiga biverkningar då medicinen går ut.

Nanna Byström
PRIMA Danderyd

1. metylfenidat, Strattera, lisdexamfetamin

- … ohanterliga biverkningar (ångest, yrsel av metylfenidat) eller otillräcklig effekt (alomoxetin) eller för kort effekt (lisdexamfetamin)

2. olika varianter av metylfenidat, Strattera, lisdexamfetamin

- provat flera varianter på metylfenidat, atomoxetin samt senast nu lisdexamfetamin …
  … biverkningar hindrat adekvat dosökning. Pat har av samtliga preparat fått flera olika biverkningar så som ÖLI-symtom, ökad aggressivitet. ångest. avtrubbning. stresskänslig. Nu återstår endast dexamfetamin …

Ola Lundin
Stockholm, privat

1. Elvanse

- Elvanse … hjärtklappning, huvudvärk irritabilitet, minskat tålamod.

2. Metylfenidat, Elvanse

- mph … otillräcklig effekt
  Elvanse … alltmer nedstämd

3. Ritalin, Elvanse

- Ritalin, biverkningar, nedstämd, inbunden, Elvanse har prövats men måste delas upp i 3 doser och effekten otillräcklig. Byte rek till Metamina.

4. Ritalin, Elvanse

- Ritalin och Elvanse. Otillräcklig effekt och uttalade biverkningar varför behandlingarna har avbrutits…

5. Metylfenidat, Elvanse

- Metylfenidat och Elvanse men behandlingarna har måst avbryter pga av svår bruxism

6. Metylfenidat, Elvanse

- metylfenidat … men behandling avbröts pga av biverkningar, hudutslag …
  Elvanse … biverkningar; ljud-/ljuskänslig, svåra migränanfall

7. Ritalin, Elvanse

- Ritalin men avbrutits pga biverkningar, panikångest och otilltäcklig effekt.
  Elvanse svår ångest, och ringa effekt…

8. Strattera, Concerta, Elvanse

- Strattera, Concerta och Elvanse under drygt ett år men samtliga preparat har gett upphov till uttalade biverkningar, polakisuri, erektil dysfunktion…

9. Metylfenidat, Elvanse

- mph … måste utsättas pga biverkn.
  Elvanse …besvärande diareer, profusa svettningar, muntorrhet, besvärande bruxism

10. Ritalin, Elvanse

- Ritalin .. avbrutits …affektinkontinens, nedstämdhet, gråtit mycket, uttalad insomnia, uttalad anorexi, otillräcklig effekt…
  Elvanse … mycket stora sömnsvårigheter…

11. Metylfenidat, Elvanse

- …metylfenidat … måste avbrytas pga avsaknad av positiv verkan och pga. biverkningar, (än mer trött, kognitivt trög och irritcnad
  Elvanse avbrytas pga biverkningar, (trött, kraftig huvudvärk, irritation)

Rickard Flodin
Capio Nacka
(Rapporterat ett fall av biverkningar för Metylfenidat Sandoz till Läkemedelsverket under 2014, ingen annan biverkningsrapport)

1. Strattera, Concerta, Elvanse

- biverkningar av Strattera och Concerta med humörsvängningar samt bristande effekt…
  Elvanse … kraftiga svettningar

2. Elvanse

- Elvanse … gav pat kraftig bt stegring

Ruth Kizza Bohlin
SLSO
(Rapporterat ett fall av biverkningar för Metylfenidat Sandoz, två för Elvanse till Läkemedelsverket under 2014, ingen annan biverkningsrapport)

1. Metylfenidater, Elvanse

- … metylfenidater med otillräcklig effekt och biverkningar i form av kraftig ångest som sitter i hela dagen, extrem trötthet på även de minsta doserna … Elvanse … occeptabla biverkningar av den. Får ökad irritabilitet och rastlöshet även på 30mg

2. alla godkända läkemedel, Elvanse

- … prövat alla godkända läkemedel med otillräcklig effekt och oacceptabla biverkningar. senaste prövat Elvanse med biverkningar på den minsta dosen

3. Långverkande metylfenidat, kortverkande Ritalin, Elvanse

- …. långverkande metylfenidat med biverkning i form av ångest, nedstämdhet, personlighetsförändring
  Kortverkande Ritalin … fortsatt ångest
  Elvanse … deprimerad…

4. godkända läkemedel

- … prövat godkända läkemedel med occeptabla biverkningar och otillräcklig effekt

5. godkända preparat, Elvanse

- dålig effekt på de godkända preparaten.
- Elvanse … biverkningar i form av spända muskler och störd sömn

Sandra Andersson
PRIMA Spånga

Concerta, Elvanse, Strattera

- Concerta … dämpad och inåtbunden
  Elvanse, upp tlll 70 mg /dygn, men det ger inte alls tillräcklig effekt.
  Strattera gav ingen effekt men ökad aggressivitet.

Sebastiano Calabro
SLSO

Strattera, Concerta, Ritalin, Medikinet

- Strattera, Concerta, Ritalin, Medikinet utan klar effekt

Stefan Ahrenstedt
Stockholm, privat

Ritalin, Elvanse

- Ritalin (sämst)
  Elvanse (inte bra, fungerade inte)

Stefan Benes
PRIMA Danderyd

Concerta, Ritalin, Elvanse

- … provat olika typer av centralstimulantia, Concerta, Ritalin, Elvanse.
  Samtliga preparat med påtagliga biverkningar och bristande effekt.

Virag Bergkvist
SLSO

Strattera, Ritalin, Elvanse

- Strattera … mycket biverkningar i form av feber och influensaliknande symtom samt vätskesamling …Ritalin … ångest och även fysiska symtom … hade ont i vänster arm och även över bröstkorgen …
  Elvanse … mycket biverkningar i form av ånqest, depression. hjärtklappninqar, vrsel och minskad aptit

Ylva Forsheden
PRIMA Handen

Ritalin, Concerta, Strattera, Elvanse

- Ritalin, Concerta, Strattera, Elvanse …Samtliga preparat har inneburit oacceptabla biverkningar som apati, förstärkt hyperaktivitet, allvarlig sömnstörning, matleda … Även bristande effekt

Ylva Stenbom
Neuropsykiatrika mottagn Bromma
(Rapporterat ett fall av biverkningar för Strattera till Läkemedelsverket under *2013*, ingen annan biverkningsrapport)

1. Strattera, Concerta, Elevanse

- … Strattera känsla av allt var tråkigt,
  blev av concerta stressad och tappade orden,
  med elvanse tappade orden och hade för bristande effekt …

2. Metylfenidat, Elvanse

- melylfenidat nedstämd …
  Ökad dos … Elvanse … stickningar och kyla i händer och fötter…

3. Metylfenidat, Elvanse

- … metylfenidat men blir aggressiv av detta.
  Blir av Elvanse yr, får sömnsvårigheter och påtagligt dålig aptit.

Åsa Anger
Capio, Maria Beroende

1. Concerta, Medikinet, Elvanse

- Concerta och medikinet med antingen otillräcklig effekt vid låg eller besvärliga biverkningar i form av viktnedgång och passivitet vid högre dos…
  Elvanse …för lång insättningsfas…

2. Ritalin, Concerta (upp till 400 mg !), Elvanse

- … provat melylfenidat (Ritalin och Concerta) i höga doser upp till 400 mg/dag) med biverkningar (huvudvärk, svettningar tremor) utan förbättrad funktionsnivå. … har under en maj-juni 2014 provat ut Elvanse, upp till 90 mg/dag utan effekt på ADHD-symtom