Läkare	[redacted]	Recept	Provat	Biverkan	Ledde till	Rapportera?
ER		Metamina	Elvanse	Trötthet	Metamina	Nej
ER		Metamina	Attentin	Behöver ta högre dos, går ur snabbare."Behov av att ta den känns obehagligt.	Metamina	Nej
CG		Metamina	Elvanse	Stel, utslägat mimik, mer ångest.	Metamina	Nej
ER		Metamina	Elvanse	sömnsvårighet	Metamina	Nej
ER		Metamina	Attentin	Metylfenidat-mer biverkningar än effekt. Attentin-ostadighet Beskriver att hon känner sig yr och "konstig" på Attantin. Hennes make har uppmärksammat ostadigare gång/påverkan på balansen. [redacted] själv påtalar att huvudvärken har varit mest påfrestande. Hennes koncentration har ytterligare försämrats av huvudvärken, smärtstillande mediciner har ej haft effekt. Känner sig ur balans och orkeslös. Även irriterad och torr i halsen.	Metamina	Nej Beror mest på patienten

ER	[redacted]			Metamina	Metamina	Samma som ovan	Metamina	Nej
ER				Metamina	Metamina	Samma som ovan	Matamina	Nej
ER				Metamina		Tidigare behandling m metylfenidat har gett kraftiga biverkningar i form av illabefinnande, känsla av avskärmning, muntorrhet samt stelhet i kroppen. Behandlingsförsök med Strattera gjordes, med kraftiga biverkningar av låg dos. Elvanse har gett bättre effekt dock biverkan i form av irritabilitet samt sömnsvårigheter då medicinens effektduration varit för lång för patienten. Har tidigare haft långverkande metylfenidat med biverkningar i form av muskelspänningar och depressivitet. Långverkande Elvanse gav ökad irritabilitet och ilska samt sömnsvårighet		Nej

						er. Strattera oklar biverkan.		
ER	[redacted]			Metamina		Elvanse på grund av för mycket eller lite effekt i realtion till mycket ojämna arbetstider. Medger positiv effekt av medicineringen när den fungerar. Patienten har på sedvanligt sätt provat metylfenidat. Denna medicinering gav mycket påtagligt illamående med viktminskning och ledvärk. Elvansemedicinering ger inte dessa biverkningar och god effekt. Problemet är dock att effekten är svår att reglera för patienten på grund av lång halveringstid. Patienten arbetar mycket oregelbundet och antingen blir effekten för kort (endos) eller för lång (tvådos). Inget som helst missbruk eller antisocialt finns som försvårande faktorer.		Nej
ER	[redacted]			Metamina	Metamin	Se ovan	Metamin	Nej

ER	Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Nej
ER	Metamina	Metamina	Se ovan	Metamin	Nej
ER	Metamina	Metamin	Se ovan	Metamin	Nej
ER	Metamina	Metamin	Se ovan	Metamin	Nej
ER	Metamina	Elvanse	Illamående: 2 Svårigheter att somna: 2 Hjärtklappning: 2 Svårigheter att få luft: 1	Metamina	Nej
ER	Metamina		Se ovan	Metamina	Nej
ER	Metamina		Se ovan	Metamina	Nej
ER	Metamina		Ej effekt av metylfenidat trots höga doser	Metamina	Nej
ER	Addera ll		Se nedan	Addera ll	Nej
ER	Metamina		Provat Metamina med god effekt, men kortverkande vilket ger svängningar i humöret, samma med Attentin. Elvanse har ej tolererats på grund av biverkningar i form av huvudvärk.		Nej
ER	Metam	Metamin	Elvanse		Rapport

				samt rastlöshet.		
ER	[redacted]	Metamina	Elvanse	Oktober 2009 fått beviljad licens för behandling med Metamina som pat. upplever har avsevärt bättre effekt jmf med metylfenidat. Elvanse har givit biverkningar i form av skakighet, mindre effekt enligt patienten.		Nej
ER	[redacted]	Metamina	Metamin	Se nedan	Metamina	Nej
ER	[redacted]	Metamina	Elvanse	Pat har generellt något sämre effekt på Elvanse jämfört med Metamina. De som skiljer enligt pat är att han fått en ökad irritation sedan han började med Elvanse. Önskar därför att återgå till tablett Metamina. **Biverkningskontroll** Förekommer då och då minskad aptit och muntorrhet.	Metamina	Nej
ER	[redacted]	Metamina		Se ovan	Metamina	Nej

RKB	[redacted]	Metamina	Ritalin, Elvanse	Tidigare behandling m metylfenidat har gett kraftiga biverkningar i form av illabefinnande, känsla av avskärmning, muntorrhet samt stelhet i kroppen. Behandlingsförsök med Strattera gjordes, med kraftiga biverkningar av låg dos. Elvanse har gett bättre effekt dock biverkan i form av irritabilitet samt sömnsvårigheter då medicinens effektduration varit för lång för patienten. Har tidigare haft långverkande metylfenidat med biverkningar i form av muskelspänningar och depressivitet. Långverkande Elvanse gav ökad irritabilitet och ilska samt sömnsvårigheter. Strattera oklar biverkan.		Nej
RKB	[redacted]	Metamina		Se ovan	Metamina	Nej

RKB		Metamina			Metamina	Nej
RKB		Metamina	Elvanse	Berättar att hon fick biverkningar i att hon kände sig mycket trött hela tiden och inte kände av någon effekt. Återgick då till behandlingen med Metamina 7,5 mg 3 gånger om dagen. Har fungerat bra på den sedan dess.		Nej
RKB		Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Nej
RKB		Metamina		Ritalinbehandling har effekt på uppmärksamheten, men får besvärande biverkningar ffa i form av muskelvärk och huvudvärk även i lägre doser av metylfenidat. Se ovan		Nej
RKB		Metamina		Patienten har provat alla godkända läkemedel med oacceptabla biverkningar även på låga doser. Provat Elvanse med oacceptabla biverkningar, bland annat depressivitet. Har haft god		Nej

					effekt på låg dos Metamina. Tacksam förnyad licens.		
RKB	[redacted]		Metamina	Elvanse	Patienten fick god effekt men oacceptabla biverknigar av olika metyfenidater. Nyligen fått angioedem i ansiktet av Elvanse.	Metamina	Rapporterat sedan tidigare
RKB	[redacted]		Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Se ovan
RKB	[redacted]		Metamina	Elvanse	Komplettering: Patienten hade otillräcklig effekt av metylfenidater men dosförhöjning försvårades av förhöjt blodtryck. Strattera ledde till ökade vredesutbrott. Elvanse fungerade bra men försämrade sömnen och blodtrycket.	Metamina	Nej
RKB	[redacted]		Metamina	Ritalin Elvanse	Patienten säger att det inte fungerar alls bra med depot dexamfetamin. Säger att det tar för lång tid för medicinen att börja fungera och därför missar han de morgontimmarna trots att han	Metamina	Nej

						tagit medicinen. Kan inte komma upp i tid och har stora initiativsvårigheter på morgonen. Upplever också att hans aptit blir mycket dämpad av Elvanse och han kan knappt äta lunch. Känner också att medicinen går ut i "fel tid" d v s sent på eftermiddagarna när han ska hämta barnen och laga mat till dem. Har tidigare haft biverkningar på olika metylfenidat. I början av behandling med Elvanse så upplevde han att trots biverkningar kunde han stå ut med den p g a de positiva effekterna han hade fått		
RKB	[redacted]			Metamina	Elvanse	Patienten med ADHD som provat metylfenidat med påtagliga biverkningar i form av ökad oro, ångest. Huvudvärk och illamående,	Metamina	Nej
RKB	[redacted]			Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Nej
RKB	[redacted]			Metamin	Elvanse	Har tidigare prövat Concerta,	Metamin	Nej

	0393					Ritalin, Strattera, Metamina och Elvanse. Pat uppger att han inte haft någon effekt av mediciner mot ADHD hittills förutom Metamina som han prövade 2010 enl journal. Han har först nu dock insatt att han hade effekt då han kunde koncentrera sig bättre. Slutade då pga utebliven effekt. Har fram till för ngåra veckor sedan haft Elvanse 100 mg/dygn. Effekten var som att dricka en kopp kaffe uppger han.		
RKB [redacted]				Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Nej
RKB [redacted]				Metamina	Ritalin Elvanse	Patienten märkte att medicinen innehöll gluten som han inte tål. Han upplevde att han under dag tre och fyra kände och mådde på samma sätt som när han äter gluten. Han undrar därför om det finns någon medicin som inte innehåller gluten. Han upplever att han fick effekt på	Metamina	Nej

						koncentration och att han blev mycket piggare samt att han kunde ta i tur med saker och få saker gjorda. Han blev dock irriterad och spänd psykiskt samt fick muskelspännin gar i nacken av medicinen. Han upplevde också att medicinen satte i för länge så att han fick mycket störd sömn på kvällen och natten. Han somnade mycket sent de dagar han tog Elvanse och han kunde inte sova framåt klockan ett eller två på natten.		
RKB	[redacted]			Metam in	Metylfen idat Elvanse	Spänd i käkar, ont i kroppen av Ritalin Elvanse: Patienten uppger att sedan dosjustering av t.Elvanse från 15mg till 30mg har patienten som bieffekt upplevelser av nedstämdhet, tyngdkänsla i kroppen, svårt att focusera blicken. Patienten uppger att hon har svårt att fungera i vardagen på grund av detta.		Nej
RKB	[redacted]			Metam	Elvanse	Man med	Metam	Nej

	18-7931	22		ina		ADHD, Tidigare behandling med Centralstimulans som Concerta, Ritalin, och Elvanse. Något marginellt positiv effekt av ovannämnda LM initialt i behandlingen, dock senare signifikant diverse biverkningar som illamående, ont i magen, nedsätt aptit som lett till att man inte har kunnat hitta optimala medicineringar för att behandla honom för ADHD problem. Strattera ej provat, men förväntas ej ge påtaglig effekt (enligt erfarenhet). Följs strukturerat på härvaran	ina	
RKB	[redacted]			Metamin	Metamina		Metamin	Nej
RKB				Adderall XR	Elvanse	Han har dock fått oacceptabla biverkningar i form av utebliven sömn, sprängande	Adderall XR	Nej

						huvudvärk med mera. (Vg se tidigare anteckningar.). Har inte kunnat jobba som vanligt sedan medicinbyte. Patientens neurolog i Göteborg Martin Fritzell har också tidigare tyckt att patienten bör bibehålla behandling med Adderall. (Vg se journalkopia från Sahlgrenska Universitets sjukhus.		
RKB				Addera ll XR	Adderall XR	Se ovan	Addera ll XR	Nej
RKB				Addera ll XR	Adderall XR	Se ovan	Addera ll XR	Nej
RKB				Metam ina		Se ovan		Nej
EM				Metam ina	Metamin a	Se ovan	Metam ina	Nej
EM				Metam in	Metamin a	Patienten har provat alla godkända läkemedel med oacceptabla biverkningar även på låga doser. Provat Elvanse med oacceptabla biverkningar, bland annat depressivitet. Har haft god effekt på låg	Metam in	Nej

			dos Metamina.		
EM	Metamin	Metamin	Se ovan	Metamina	Nej
LT	Metamina	Elvanse Strattera Metylfenidat	Elvanse: Elvanse 30 mg, beskriver god effekt på ADHD-symtom, dock besväras mycket av biverkningar såsom huvudvärk, torr hud, muskel- och ledvärk, muntorrhet, sexuella biverkningar både minskad lust och funktion.	Metamin	Nej
LT	Metamina	Metamina	Se ovan	Metamina	Nej
LT	Metamina	Metamina	Oklar	Metamina	Nej
LT	Metamina	Metamina	oklar	Metamin	Nej

		ina	a	Angioödem i ansiktet tidigare		erat
ER		Metamina		Försök med Elvanse ha genomförts men får för lång effektduration vilket påverkar sömnen. Attentin behöver tas i dubbel dos jämfört med metamina.. Får klåda i ansiktet, ser dubbelt. gungar. Känner sig illamående och blir förstoppad.		Nej?
ER		Metamina	Metamina	Se nedan	Metamina	Nej
ER		Metamina	Attentin	Patienten uppger minskad energi tycker att det tar längre tid innan hon får effekt på Attentin. Känner sig ojämnare i humöret vilket även påtalats av maken samt sämre effekt på oro/rastlöshet. **Biverkningskontroll** Förekommer ofta muntorrhet. Förekommer då och då oro med humör svängningar, huvudvärk när medicinen går ur på e.m.		Nej